

## Studien zu Bewegungsstörungen

Name	Krankheitsbild	Information
<b>OPTIPARK:</b> Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit von Opicapone in der klinischen Praxis	Parkinson-Patienten mit motorischen Fluktuationen mit „Wearing-off“-Phänomen	Anna-Lena Schwake 83 46081
<b>SYNAPSES:</b> Studie zur Beobachtung des Sicherheitsprofils und Anwendungsmusters von Sabinamid im klinischen Alltag während der ersten Phase nach der Zulassung	Patienten mit idiopathischer Parkinson-Krankheit (bei stabiler Levodopa-Therapie) im mittlerem bis spätem Stadium mit Fluktuationen	
<b>ProPSP:</b> Prospektive Beobachtungsstudie zur Erforschung von Demographie, klinischem Verlauf und Biomarkern der progressiven supranukleären Blickparese	Patienten mit der Diagnose progressive supranukleäre Blickparese	
<b>EMST-Studie:</b> Vierwöchiges häusliches Training zur Stärkung der Rachenmuskulatur und damit zur Verbesserung der mit dem Parkinson-Syndrom verbundenen Schluckstörung	Patienten mit <ul style="list-style-type: none"> <li>• einem sicher diagnostizierten idiopathischen Parkinsonsyndrom (Stadium II-IV)</li> <li>• Verdacht auf eine mit der Erkrankung verbundene Schluckstörung (andere Ursachen sollten ausgeschlossen sein)</li> <li>• aktuell stabiler Medikation</li> </ul>	