

Infektionsdiagnostik

(bitte Rückseite beachten)

Nur mit dunklem
Stift markieren
 falsch richtig

5.1



Centrum für Laboratoriumsmedizin
– Zentrallaboratorium –
MVZ Abteilung für
Laboratoriumsmedizin
Leiter: Dr. med. Bernhard Schlüter



Angaben zu Patient, Probe und Abnahmezeitpunkt

hier kein Barcodeetikett kleben

Angaben zum Auftraggeber

Datum _____

Telefon/Funk _____

Anfordernde(r) Ärztin/Arzt (Blockschrift)/(Unterschrift) _____

Bitte Einsendereiticket hier einkleben

Telefon: 42345

Musterklinik ABC – Station XYZ
KST: 3334455
>1111 44

Infektiös: HIV

Hepatitis B

Hepatitis C

Wichtig: unbedingt Monovette mit **Infektiös** bekleben

Infos zu Laborparametern und Präanalytik unter: zlab.ukmuenster.de

Serologie

Hepatitis A

- Infektionsstatus
- Impfstatus

Hepatitis B

- Infektionsstatus
- Impfstatus
- HBsAg Konzentration (nur nach Absprache)

Hepatitis C

- anti-HCV

Hepatitis Delta (nur bei positivem HBsAg)

- anti-HDV IgG und IgM
- HDV Ag (nur nach Absprache)

Hepatitis E

- anti-HEV

Humanes Immundefizienz-Virus (HIV)

- anti-HIV-1/HIV-2

Cytomegalie-Virus (CMV)

- anti-CMV IgG
- anti-CMV IgM

Epstein-Barr-Virus (EBV)

- anti-EBV IgM
- anti-VCA IgG
- anti-EBNA IgG

Herpes-Simplex-Virus (HSV)

- anti-HSV-1/HSV-2 IgG
- anti-HSV-1/HSV-2 IgM

Varicella-Zoster-Virus (VZV)

- anti-VZV IgG
- anti-VZV IgM

- sonstige: _____

Bitte A-Etikett des Doppelletikettes hier einkleben

33881111 0007 02.05.1955

A MUSTERMANN, WERNER

PCR

- Hepatitis B-DNA quantitativ
- Hepatitis C-RNA quantitativ
- Hepatitis C-Genotypisierung
- Hepatitis Delta-RNA quantitativ

- sonstige: _____

Probenannahme: Mo – Fr: 7:00 – 14:30 Uhr!

Bitte A-Etikett des Doppelletikettes hier einkleben

33881111 0008 02.05.1955

A MUSTERMANN, WERNER

PCR

- HIV-1 RNA quantitativ
- HIV-1 genotypische Resistenz (PI, NRTI, NNRTI)
- HIV-1 genotypische Resistenz (Integrase)

- sonstige: _____

Probenannahme: Mo – Fr: 7:00 – 14:30 Uhr!

Bitte A-Etikett des Doppelletikettes hier einkleben

33881111 0009 02.05.1955

A MUSTERMANN, WERNER

PCR

- BKV-DNA quantitativ
- CMV-DNA quantitativ
- EBV-DNA quantitativ
- HSV-1/HSV-2-DNA quantitativ
- VZV-DNA quantitativ

- sonstige: _____

Probenannahme: Mo – Fr: 7:00 – 14:30 Uhr!

Bitte A-Etikett des Doppelletikettes hier einkleben

33881111 0010 02.05.1955

A MUSTERMANN, WERNER

Wichtige Hinweise:

- Infos zu Laborparametern und Präanalytik unter: zlab.ukmuenster.de

Hepatitis A	
Infektionsstatus	Anti-HAV total, Anti-HAV IgM
Impfstatus	Anti-HAV total quantitativ
Hepatitis B	
Infektionsstatus	HBsAg , HBeAg, Anti-HBc , Anti-HBc IgM, Anti-HBs, Anti-HBe; bei positivem HBsAg Erstbefund Bestätigungstest mittels HBsAg conf
Impfstatus	Anti-HBs quantitativ
HBsAg Konzentration (nur nach Absprache)	HBsAg quantitativ (Therapiekontrolle)
Hepatitis C*	
anti-HCV	Suchtest, bei positivem Erstbefund Bestätigungstest mittels Immunoblot
Hepatitis Delta (nur bei positivem HBsAg)*	
anti-HDV IgG und IgM	Unterscheidung von akuter und chronischer Infektion, Koinfektion und Superinfektion
HDV Ag (nur nach Absprache)	Nachweis nur in Inkubationszeit und früher Akutphase sinnvoll
Hepatitis E	
anti-HEV	Anti-HEV IgG, Anti-HEV IgM
Humanes Immundefizienz-Virus (HIV)*	
anti-HIV-1/HIV-2	Suchtest, bei positivem Erstbefund Bestätigungstest mittels Immunoblot

Notfallparameter: rot markiert

* in der frühen Inkubationszeit, bei kompromittiertem Immunsystem und Zuständen mit Immunglobulinverlust sowie zur Therapiekontrolle ist ggf. eine Viruslastbestimmung (PCR) indiziert

Zu verwendende Röhren:

Serum Gel 7,5 ml	SAP 2052310	EDTA 9 ml	SAP 2000611
Li-Heparin Gel 7,5 ml	SAP 2052311		