

Lokale Reizung

Information

Eine lokale Reizung (chemische Phlebitis) kann trotz korrekter Verabreichung der Zytostatika im Bereich der Einstichstelle und im Verlauf der Venen auftreten. Neben den lokalen Schmerzen stellt die chemische Phlebitis eine große Belastung für den Patienten dar, weil die betroffene Vene für weitere Blutentnahmen und medikamentöse Therapien nicht mehr in Frage kommt.

Auf was muss ich achten?

Symptome können sofort aber auch erst nach Tagen und Wochen auftreten. Auf folgende Symptome sollten Sie achten:

Frühsymptome

- brennende Schmerzen an der Injektionsstelle
- brennende und/oder krampfartige Schmerzen im Verlauf der Vene

Weitere Symptome nach Tagen und Wochen

- Rötung und Schwellung im Bereich der Vene
- Schmerzen im Verlauf der Vene
- Verhärtung im Bereich der Vene
- bräunliche Verfärbungen längs der Vene (nach Wochen)
- anhaltende, strangförmige Verhärtung der Vene (nach Wochen)

Was kann ich selbst tun?

- Beobachten Sie die Haut an der Einstichstelle und den Verlauf der Vene nicht nur am Tag der Chemotherapie, sondern über einen längeren Zeitraum.
- Bei Schmerzen und Rötungen können Sie in Absprache mit den Pflegenden und Ärzten zur Linderung der Symptome kühle Wickel oder Wickel mit lokal wirksamen Salben auflegen.

Wann informiere ich Pflegende/Ärzte?

Wenn Sie Rötungen und Schmerzen oder auch andere Veränderungen feststellen, melden Sie sich bitte umgehend bei den Pflegenden und Ärzten.