

<b>Kurztitel</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Studiendesign</b>	<b>Tumor</b>	<b>Status</b>
<b>TIGER</b>	Studie zur Anwendung von TTFields in der klinischen Routine, bei Patientinnen und Patienten mit einem neu diagnostizierten Glioblastom (GBM) in Deutschland	nicht-interventionell	GBM	geschlossen
<b>Gliovax</b>	Phase-II trial of vaccination with lysate-loaded, mature dendritic cells integrated into standard radiochemotherapy in newly diagnosed glioblastoma	Phase-II	GBM	offen
<b>SNOXA12C401 (GLORIA)</b>	Single-arm, dose-escalation, Phase 1/2 study of olaptesed pegol (NOX-A12) in combination with irradiation in inoperable or partially resected first-line glioblastoma patients with unmethylated MGMT promoter	Phase I/II	GBM (MGMT unmethylated)	geplant
<b>NOA-022</b>	A Phase I trial to determine the maximum tolerated dose and patient-specific dosimetry of fractionated intracavitary radioimmunotherapy with Lu-177 labeled 6A10 Fab-fragments in patients with glioblastoma multiforme after standard treatment and stable disease.	Phase-I	GBM zur Erhaltungstherapie	noch nicht geöffnet
<b>ReCog-GBM-L/NOA-019</b>	Retest-Reliabilität und lokalisationsabhängige Sensitivität neurokognitiver Testung bei erstdiagnostizierten Glioblastom-Patienten	nicht-interventionell	GBM	offen
<b>NOA-011:</b>	Controlled clinical trial to evaluate the safety and efficacy of stereotactical photodynamic therapy with 5-amino-levulinic acid (Gliolan) in recurrent glioblastoma	Phase-II	Rezidiv-GBM	noch nicht geöffnet
<b>RESURGE</b>	Surgery for Recurrent Glioblastoma Randomisierte kontrollierte komparative Phase-III-Studie zur Chirurgie bei Glioblastom-Rezidiv	Phase-III	Rezidiv-GBM	offen
<b>NOA-013</b>	Prospektive Beobachtungsstudie zur Chemotherapie bei nichtspezifisch vorbehandelten Patienten mit primärem ZNS-Lymphom im jüngeren Lebensalter (PZNSL)	Registerstudie	Primäres ZNS-Lymphom	offen
<b>NXDC-MEN-301</b>	A Phase 3 Multicenter Study of Gleolan (Aminolevulinic Acid Hydrochloride) to Enhance Visualization of Tumor in Patients with Newly Diagnosed or Recurrent Meningiomas	Phase-III	Meningeom	noch nicht geöffnet

<b>AkNiPro2</b>	Prophylactic nimodipine treatment for hearing preservation after vestibular schwannoma surgery: a randomized multi-centre phase III trial	Phase-III	Akustikusneurinom	offen
-----------------	---	-----------	-------------------	-------