

Universitätsklinikum Münster . 48129 Münster .

Klinik für Nuklearmedizin

Univ.-Prof. Dr. med. Michael Schäfers
Direktor

—
Ansprechpartner Schilddrüsenambulanz:
Fatima Akil-Pape
Dagmar Schmüdgen-Stoos

Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude A1
48149 Münster

T +49 251 83-47349

F +49 251 83-44755

Servicezentrale: T +49 251 83-55555

sd-ambulanz@ukmuenster.de

www.ukm.de

Anforderungsformular für Patientinn/en mit Schilddrüsenkarzinomen

Kontaktdaten Endokrine Chirurgie:	
Patientenname, Vorname, Geburtsdatum:	
Anschrift:	
Telefon: / Mobil:	
Krankenversicherung:	
ECOG (0-5):	
Harn- und / oder Stuhlinkontinenz:	
Mobilität:	
Arztbrief (OP-Bericht, Pathologie-Befund):	
Aktuelle Bildgebung (Bitte auf CD oder per xPipe senden!)	

Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte achten Sie auf Vollständigkeit der Unterlagen. Das beinhaltet auch die Zusendung der Bilddaten elektronisch oder auf CD sowie die komplett ausgefüllte Seite 2. Dies ist besonders wichtig da es sonst zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen kommen kann.

Ihre Klinik für Nuklearmedizin

Zutreffendes bitte ankreuzen:	Hochrisiko-Profil:
Papilläres Schilddrüsenkarzinom (PTC) <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Makroskopische Tumorinvasion in extrathyreoidales Gewebe <input type="checkbox"/> • Keine R0 Resektion <input type="checkbox"/> • pN1 mit LK > 3 cm <input type="checkbox"/> • Fernmetastasen <input type="checkbox"/>
Follikuläres Schilddrüsenkarzinom (FTC) <input type="checkbox"/>	
Invasives gekapseltes papilläres Schilddrüsenkarzinom follikuläre Variante (IEFVPTC) <input type="checkbox"/>	
Onkozytäres Schilddrüsenkarzinom (OTC) <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Grob invasiv mit V > 2 Foci <input type="checkbox"/> • Fernmetastasen <input type="checkbox"/>
Differenziertes high-grade Schilddrüsenkarzinom (DHGTC) <input type="checkbox"/>	
Schlecht differenziertes Schilddrüsenkarzinom (PDTC) <input type="checkbox"/>	
Anaplastisches Schilddrüsenkarzinom (ATC) <input type="checkbox"/>	
Medulläres Schilddrüsenkarzinom (MTC) <input type="checkbox"/>	
Andere <input type="checkbox"/>	

Bei Hochrisiko-Profil bitte unter Berücksichtigung der Kontraindikationen kein L-Thyroxin ansetzen.

Kontraindikationen Hypothyreose	
Kardiopulmonale Erkrankungen	<input type="checkbox"/>
Diabetes mellitus	<input type="checkbox"/>
Niereninsuffizienz	<input type="checkbox"/>
Neurologische / psychiatrische Erkrankungen	<input type="checkbox"/>
Bilaterale Recurrensparese	<input type="checkbox"/>
Hypothalamisch / hypophysäre Störungen	<input type="checkbox"/>
Antikoagulantien	<input type="checkbox"/>
Lithium	<input type="checkbox"/>
Andere	<input type="checkbox"/>